

Medicatiegebruik bij endoscopisch onderzoek

Inhoudsopgave

Coloscopie of combinatieonderzoek:

- Anticonceptiepil 1
- Bloeddrukverlagende medicijnen 1
- Bloedverdunners 1
- Prednison 1
- Ferrofumaraat (ijzertabletten) 1
- Hydrocortison 1
- Diabetes 2

Gastroscopie:

- Bloeddrukverlagende medicijnen 3
- Prednison 3
- Hydrocortison 3
- Diabetes 4

Medicatiegebruik – coloscopie en combinatieonderzoek coloscopie/gastroscoopie

Gebruikt u medicatie op de dag van het onderzoek? Neem dit dan altijd 2 uur vóór het onderzoek in, na het afronden van het laxeerschema.

Volg voor de volgende typen medicatie onderstaand advies:

Anticonceptiepil:

- Door het laxeren werkt de anticonceptiepil minder goed. Slikt u de anticonceptiepil? Gebruik dan tot aan uw volgende menstruatie aanvullende voorbehoedsmiddelen, zoals een condoom.

Bloeddrukverlagende medicijnen:

- Het is belangrijk dat u deze inneemt op de dag van het onderzoek. Doe dit 2 uur vóór het onderzoek.

Bloedverdunners:

- De verpleegkundige neemt contact met u op om te bespreken of u tijdelijk moet stoppen met de bloedverdunners en zo ja, vanaf wanneer.

Prednison:

- Gebruikt u minder dan 20 mg Prednison per dag? Neem dan op de dag van het onderzoek een dubbele dosis Prednison. Doe dit 2 uur voor het onderzoek.
- Gebruikt u méér dan 20 mg Prednison per dag? Neem dan uw gebruikelijke dosis. Doe dit 2 uur voor het onderzoek.

Ferrofumaraat (ijzertabletten):

- Stop hier vanaf 5 dagen vóór het onderzoek tijdelijk mee. Na afloop van het onderzoek kunt u weer starten met de ijzertabletten.

Hydrocortison:

- De dag vóór het onderzoek:
 - Neem tijdens de laatste maaltijd (en dus voordat u begint met laxeren) het dubbele van uw gebruikelijke dosering Hydrocortison.
 - Neem nogmaals een dubbele dosis Hydrocortison voordat u gaat slapen.
- De dag van het onderzoek: Neem nogmaals een dubbele dosis Hydrocortison na afloop van het laxeren, Doe dit 2 uur voor het onderzoek.

Diabetes en coloscopie

Algemeen advies (zowel bij gebruik van bloedsuiker regulerende tabletten als bij insulinegebruik):

- Volg het vezelarme dieet zoals beschreven in de instructie voor de darmvoorbereiding.
- Neem uw bloedsuikerverlagende medicijnen mee naar het onderzoek.
- Bepaalt u zelf uw bloedsuiker? Neem dan ook uw bloedsuikermeter mee naar het onderzoek.
- Neem begeleiding mee op de dag van de afspraak (minimaal 18 jaar oud)

Let op: door de darmvoorbereiding bestaat er een verhoogde kans op hypoglykemie. Het onderzoek wordt bij voorkeur in de ochtend ingepland, zodat de tijd dat u nuchter moet zijn zoveel mogelijk beperkt wordt. Heeft u vragen of problemen die verband houden met uw diabetes? Neem dan altijd contact op met uw diabetesverpleegkundige of behandelend arts.

Advies bloedsuiker controle

Controleer regelmatig uw bloedsuiker tijdens de darmvoorbereiding, zeker als u insuline gebruikt. Controleer sowieso uw bloedsuiker op de volgende momenten:

- Altijd wanneer u zich onwel voelt.
- Minimaal 4x op de dag voor het onderzoek: voor ontbijt, voor lunch, rond 18.00 uur en voor het slapen gaan.
- Op de dag van het onderzoek; in ieder geval één keer voorafgaand aan de scopie.

Voor afwijkende bloedglucosewaarden geldt: Neem bij twijfel contact op met uw diabetesverpleegkundige (of behandelend arts).

Advies bloedsuiker regulerende medicijnen

- Slikt u bloedsuikerverlagende tabletten? Neem deze dan niet in op de dag vóór het onderzoek en de dag van het onderzoek. Na het onderzoek kunt u uw gebruikelijke dosering weer aanhouden.
- Gebruikt u een GLP1 receptor agonist of insuline (kort- of langwerkend)? Bij gebruik van GLP1 receptor agonist of Insuline (kort- of langwerkend) neemt u altijd contact op met uw diabetesverpleegkundige (of behandelend arts) om een voorbereidingsschema af te stemmen.

Medicatiegebruik - gastroscopie

Bloeddrukverlagende medicijnen:

- Het is belangrijk dat u deze inneemt op de dag van het onderzoek.
- Doe dit 2 uur vóór het onderzoek.

Prednison:

- Gebruikt u minder dan 20 mg Prednison per dag? Neem dan op de dag van het onderzoek een dubbele dosis Prednison.
- Gebruikt u méér dan 20 mg Prednison per dag? Neem dan uw gebruikelijke dosis.

Hydrocortison:

- De dag van het onderzoek: Neem het dubbele van uw gebruikelijke dosering Hydrocortison 2 uur voor het onderzoek.

Diabetes en gastroscopie

Algemeen advies (zowel bij gebruik van bloedsuiker regulerende tabletten als bij insulinegebruik)

- Volg qua voorbereiding het 'nuchter beleid' zoals beschreven in de voorlichtingsmodule.
- Neem uw bloedsuikerverlagende medicijnen mee naar het onderzoek.
- Bepaalt u zelf uw bloedsuiker? Neem dan ook uw bloedsuikermeter mee naar het onderzoek.
- Kom met begeleiding naar de kliniek

Advies bloedsuiker controle

- Controleer regelmatig uw bloedsuiker vanaf het moment dat u nuchter bent (6 uur voor het onderzoek zeker als u insuline gebruikt. Controleer sowieso uw bloedsuiker op de volgende momenten:
 - Altijd wanneer u zich onwel voelt.
 - Op de dag van het onderzoek; in ieder geval één keer voorafgaand aan de scopie.

Advies bloedsuikerverlagende tabletten

Het onderzoek wordt bij voorkeur in de ochtend ingepland.

- Op de dag voor het onderzoek: Gebruik geen bloedsuikerverlagende tabletten.
- Na het onderzoek: Gebruik vanaf het moment dat u mag eten weer de gebruikelijke dosering bloedsuikerverlagende tabletten.

Advies insuline

- Gebruikt u insuline? Pas dan, in overleg met uw diabetesverpleegkundige of behandelend arts, de ochtenddosering aan op de dag van de gastroscopie.
- Bij gebruik van GLP1 receptor agonist of Insuline (kort- of langwerkend) neemt u altijd contact op met uw diabetesverpleegkundige (of behandelend arts) om een voorbereidingsschema af te stemmen.