

NAZORG NA ROESJE EN/OF PIJNSTILLING

Adviezen

Na toediening van een roesje en/of pijnstilling worden u de volgende punten afgeraden in de eerste 24 uur na het onderzoek:

- Het nuttigen van alcoholische dranken.
- Het nemen van belangrijke beslissingen.
- Het deelnemen aan het verkeer.
- Het bedienen van machines.

Let op: U bent onverzekerd wanneer u binnen 24 uur na het onderzoek een ongeluk veroorzaakt onder deze omstandigheden.

Mogelijke klachten na een endoscopisch onderzoek

Na een gastroscopie kan uw keel wat geïrriteerd aanvoelen. Gorgelen met lauwwarm water of het gebruik van keelpastilles kan de klachten verminderen.

Na een onderzoek van de darmen kunt u klachten hebben zoals een opgeblazen gevoel, kramp, buikpijn en winderigheid. Dit is normaal en wordt meestal veroorzaakt door ingeblazen lucht tijdens het darmonderzoek.

Beweging helpt u om deze overvloedige lucht kwijt te raken. Deze klachten verdwijnen meestal weer binnen een dag of twee.

Neem direct contact met ons op bij de volgende klachten:

- Ernstig bloedverlies (meer dan 1 kopje)
- Ernstige buikpijn en/of braken;
- Plotselinge huiduitslag of jeuk;
- Kortademigheid;
- Zwelling van uw gezicht en/of tong.

U kunt ons bereiken via **088 8884555**.

Kijk op onze website **polidirect.nl/contact** voor informatie over onze bereikbaarheid en openingstijden. Voor niet dringende vragen kunt het **contactformulier** invullen. We nemen dan binnen 3 werkdagen contact met u op.

Bij acute klachten kunt u contact opnemen via
(088) 888 4555 (optie 1 voor speed)

Hoe heeft **u** PoliDirect ervaren?

Deel uw ervaring op Google of ZorgkaartNederland en **help** andere patiënten met het kiezen van een zorgverlener.

